

ALTERACIONS DE LA CONSCIÈNCIA

□ **Tipus:**

Lipotímia: pèrdua de consciència momentània amb sensació de mareig, visió borrosa i sudoració freda. Té una recuperació ràpida. Es recomana col·locar l'afectat en posició de Tredelamburg.

Síncope: pèrdua de consciència brusca, transitòria i del to postural. Té una recuperació ràpida.

Estat de xoc: presenta una profunda depressió nerviosa i circulatòria (lent de reflexes). La persona té consciència però pot estar marejat, inquiet, etc. Té un pols ràpid, respiració superficial, sudoració freda i obnubilació.

Pot estar causat per grans ferides, traumatismes interns o pèrdua massiva de sang.

Actuació: cal assegurar la respiració, tenir un control de les funcions vitals, posició de Tredelamburg i trasllat urgent.

ALTERACIONS DE LA CONSCIÈNCIA

□ **ATURADA CARDIORESPIRATÒRIA**

És una aturada cardíaca que sempre va acompanyada de una pèrdua de consciència i una aturada de la respiració.

Causes:

Fallida cardíaca

Obstrucció de les vies respiratòries (si no podem respirar a causa d'algun obstacle i no rebem aire als pulmons; el cor s'atura en qüestió de 2' o 3').

Respirar aire amb poc oxigen

Alteració dels músculs respiratoris (cop al cap, intoxicació per medicaments, electrocució, etc)
